乳幼児の誤嚥・窒息への対応



誤嚥・窒息が発生

応援を要請 119番通報

呼吸困難の確認例
- 苦しそうにのど元や口に手や指を持っていく、もがく
- 意識はあるのに声が出ない
- 泣いているのに泣き声が出ない
- 顔色が紫色、蒼白である
- 急にせき込み始めた
- 突然ゼイゼイし始めた

呼吸困難の有無
- なし → 呼吸に注意して観察
- あり

呼吸の確認例
- こどもが好む姿勢にする
- 呼吸困難がないか注意しながら経過観察

呼吸に注意して観察
- 呼吸困難の発生 → 意識障害に注意して観察

意識障害の確認例
- 声掛け、刺激に応答がない（反応なし）
- 開眼しない
- 視線が合わない

意識障害に注意して観察
- 意識障害の発生

呼吸ができない、意識障害の有無
- なし → 救急隊の到着を待つ
- あり



心肺蘇生の開始・AEDの準備と装着

窒息の解除

1歳未満	1歳以上
背部叩打法 ⇄ 胸部突き上げ法	背部叩打法 → 無効の場合 腹部突き上げ法



※窒息が解除できるまで続ける

意識障害の発生

救急隊の到着を待つ

心停止
誤嚥・窒息
アナフィラキシー
熱中症
頭部外傷
歯・口の外傷
眼の外傷
手指の外傷