乳幼児の 歯・口の外傷への対応

歯・口の外傷発生

口唇・口の中の粘膜の外傷

- 口の中が切れた
- 唇が切れた

圧迫止血をする

- 出血が少ない → 様子を見る
- 出血が多い → 傷口が大きければ清潔なもので圧迫する

歯の外傷



歯根破折の疑い



痛みのあるときは早めに歯科医院へ

歯冠の亀裂



特に手当ての必要はない

歯冠破折



- 神経が見えていればすぐに歯科医院へ
- 表面麻酔薬があれば付けて圧接
- 神経が出ていなければ慌てる必要はありません
- 大きなかけらは探して持参（できれば「保存液」か「牛乳」に入れて保存）

動揺
- あり → 歯根破折の疑い
- なし → 歯が欠けた
  - 線が入った → 歯冠の亀裂
  - あり → 歯冠破折

歯の位置異常
- あり
- なし → 動揺

歯の位置異常

- 脱臼
  - 不完全脱臼 → 安静にして歯科医院へ
  - 完全脱臼 → 乳歯を探して保存液か牛乳に入れて歯科医院へ
- 陥入 → 乳歯が中にめり込んだ → 清潔なもので圧迫止血して歯科医院へ
- 下顎骨骨折 → 歯並びがずれた、痛みが強い、口が閉まらない → 119番通報

顎関節の外傷

耳の付け根が痛い・腫れる
冷やして直ちに受診
▪歯科・整形外科等



心停止
誤嚥・窒息
アナフィラキシー
熱中症
頭部外傷
歯・口の外傷
眼の外傷
手指の外傷